

Questions – réponses sur la pratique transfusionnelle SFVTT

Docteur Sylvie SCHLANGER
Coordonnateur Régional d'Hémovigilance

Questions - réponses

Groupage sanguin

Peut-on prélever une deuxième détermination sur un cathéter posé lors de la réalisation du premier prélèvement ?

Peut-on valider un groupage sanguin après une transfusion ?

Questions - réponses

Recherche d'anticorps irréguliers

En cas de transfusion quotidienne refait-on une RAI tous les jours ?

Questions - réponses Compatibilisation

Quand faut-il une épreuve de compatibilité ?

Validité de l'épreuve de compatibilité ?

Questions - réponses Compatibilisation

Pourquoi les CGR O négatif ne sont-ils pas compatibles avec tous les malades ?

Peut-on transfuser des concentrés de plaquettes non ABO compatibles ?

Questions - réponses

Acte transfusionnel

Que faire s'il n'y a pas de médecin présent dans un établissement de santé et qu'une transfusion a été prescrite ?

Le patient peut-il manger pendant une transfusion ?

Peut-on transfuser un patient hyperthermique ?

Questions - réponses

Acte transfusionnel

Peut-on transfuser un patient assis dans un fauteuil ?

Le patient peut-il se lever pendant une transfusion ?

Faut-il changer de transfuseur à chaque PSL ?

Peut-on transfuser 2 PSL en même temps à un même patient ?
(hors UVI et bloc opératoire)

Questions - réponses

Contrôle ultime prétransfusionnel (CUPT)

Doit-on réaliser un CUPT quand on transfuse du plasma ou un concentré de plaquettes ?

Doit-on réaliser un CUPT quand on transfuse un patient dont le résultat de groupe sanguin est ininterprétable par polyagglutination ?

Questions - réponses Hospitalisation de jour

Combien de temps doit-on garder un patient avant de le laisser sortir après une transfusion ?