# AMÉLIORER LE DÉPISTAGE DES ALLO-IMMUNISATIONS TRANSFUSIONNELLES



#### P. CABRE 1, M. SANDLARZ 1, L. BRISSET 1, S. SEGOVIA-KUENY 2

<sup>1</sup> Cellule Régionale d'Hémovigilance Nord - Pas-de-Calais - <sup>2</sup> Directrice générale adjointe, directrice de la santé publique et environnementale de l'ARS Nord -Pas-de-Calais

#### Semaine sécurité des patients du 21 au 25 novembre 2011

Objectifs de cette campagne : mettre l'accent sur l'importance du dialogue entre les usagers et les professionnels de santé, la bonne utilisation des médicaments, mais également, comprendre les indicateurs qualité et agir sur les situations à risque.

#### ACTION SPÉCIFIQUE EN HÉMOVIGILANCE : RAI POST-TRANSFUSIONNELLE

La non détection d'une allo-immunisation transfusionnelle induit un risque de conflit immunologique lors d'une transfusion ou d'une grossesse ultérieure. La fréquence de l'allo-immunisation est de 39 pour 10 000 patients et représente 36,1% des déclarations d'effets indésirables receveurs reçues par l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et Produits de Santé (ANSM) en 2011

## MATÉRIEL ET MÉTHODES

#### ACTEURS CONCERNÉS

- Les patients
- Les prescripteurs de produits sanguins
- Les médecins traitants

### ACTIONS DE COMMUNICATION

#### MOBILISATION DU RÉSEAU D'HÉMOVIGILANCE


- 83 ES transfuseurs dans la région Nord Pas-de-Calais
- Présentation du projet lors des CSTH de cette période
- Pré-sollicitation des acteurs

## FLYER DESTINÉ AUX PATIENTS TRANSFUSÉS



hs certains cas, le malade peut produire des

corps contre les globules rouges qu'il a reçus, car



transfusion ou par votre médecin traitant, qui


doit alors mentionner que les résultats doivent

aussi être transmis par le laboratoire au

Où réaliser cet examen post-transfusionnel?

médecin prescripteur de la transfusion.

habituel, sur prescription médicale



Quand réaliser

transfusion pour sa réalisation

transfusionnel?



Il faut attendre de 4 à 12 semaines après la



#### Élaboration

CRH / ARS Nord Pas-de-Calais

#### Contenu

Explications vulgarisées expliquant l'intérêt de réaliser la RAI une à trois semaines après la transfusion.

#### Suggestions d'utilisation

- À donner à tous les patients sortant d'hospitalisation
- À donner aux accueils des ES pendant cette semaine d'action
- Support de communication si option « stand hémovigilance » avec dialogue entre professionnel de santé-usager ES

#### Diffusion

- de 25000 exemplaires imprimés aux ES engagés dans le projet
- d'une version PDF aux ES (réseau CHv, Directions ES)

## **Budgétisation**

ARS (25000 exemplaires) / ES

## COURRIER ADRESSÉ AUX MÉDECINS TRAITANTS

#### SYMBOLIQUE DU MESSAGE Correspondant Hémovigilance 4 à 12 sem RAI de l'Etablissement de Santé

## Élaboration

CRH / ARS Nord Pas-de-Calais

## Contenu

Sensibilisation à la réalisation des RAI chez leur patient, ainsi qu'au renvoi des résultats vers la structure de soins

## Suggestions d'utilisation

- À envoyer systématiquement avec les courriers de sortie, pendant la semaine d'action
- Mailing aux médecins traitants des patients de l'ES


## Diffusion

Version PDF diffusée aux ES (réseau CHv, Directions ES)


**Budgétisation** - ES

## RÉSULTATS: LES INDICATEURS

#### Taux d'engagement des ES transfuseurs du Nord Pas-de-Calais 100% 80% 60% 179455 40% 64 20% 0% n PSL n ES ■ ES engagés ■ ES non engagés



Taux d'utilisation du flyer par les ES




Taux d'utilisation du courrier type

## Taux effectif de participation des ES transfuseurs du Nord Pas-de-Calais

- 89% (74/83) transfuseurs ont participé à l'action dont 100% des ES engagés
- Plus de 10% des ES ont organisé et tenu un stand hémovigilance pendant cette semaine

## CONCLUSION

- Appropriation des supports en routine par de nombreux ES y compris hors région
- Suivi du taux de retour des RAI (année n+1)



■ oui □ non

Taux d'utilisation des supports en « routine » par les ES participants du Nord Pas-de-Calais