

Information à l'attention du patient quittant l'établissement après une transfusion

Madame, Monsieur,

Lors de votre hospitalisation ce jour, vous avez été **transfusé(e) d'un ou plusieurs produit(s) sanguin(s) labile(s)** : Concentré(s) de Globules rouges, de Plaquettes ou Plasmas.

Ce traitement impose une surveillance attentive dans les heures qui suivent votre retour à domicile. **Un ou plusieurs des signes cités ci-dessous sont susceptibles d'apparaître à distance et d'être liés à cette transfusion.**

Dans les heures qui viennent :

- fièvre
- frissons, sensation de froid
- urticaire (réaction allergique : plaques rouges avec démangeaisons)
- signes digestifs : douleurs abdominales, diarrhée, nausées et/ou vomissements
- essoufflement, toux ou difficulté à respirer
- douleurs lombaires
- sensation de malaise

Le lendemain :

- ictère (jaunisse)
- urines foncées ou rouges

Si vous constatez l'apparition d'un ou plusieurs de ces signes après votre sortie, vous devez contacter le service afin de convenir de la conduite à adopter :

Nom :

Numéro de téléphone :

En dehors des horaires d'ouverture :

Nom :

Numéro de téléphone :

Il est recommandé de ne pas conduire dans les heures qui suivent la transfusion et de rester au repos

DATE